

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription  
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70



## Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 24  
du 13 Janvier 1984.

BONNE ANNEE A TOUS

et merci à tous ceux qui, par leurs envois de relevés météorologiques et leurs observations contribuent à l'élaboration de ce bulletin.

### BILAN de l'ANNEE 1983

Température moyenne et écart aux températures normales

BASTIA			AJACCIO		
Mois	Temp. moyennes	Ecart	Temp. moyennes	Ecart	
J	10,6	+ 1,7	8,8	+ 0,4	
F	8,5	- 0,7	7,6	- 1,1	
M	11,7	+ 1,3	10,3	+ 0,2	
A	13,5	+ 0,8	12,9	+ 0,7	
M	16,4	+ 0,3	16,1	+ 0,5	
J	20	0	20,1	+ 0,9	
J	24,9	+ 2,1	24,7	+ 3,1	
A	23,1	+ 0,3	23,1	+ 1,2	
S	21	+ 0,6	20,5	+ 0,8	
O	17	+ 0,4	16,4	+ 0,1	
N	13,3	+ 0,5	13,6	+ 1,2	
D	9,7	- 0,3	9,4	- 0,1	

Précipitations mensuelles et écart aux normales (en mm d'eau)

BASTIA			AJACCIO		
Mois	Précipitations	Ecart	Précipitations	Ecart	
J	12,6	- 56	4,1	- 70,9	
F	26,2	- 60,60	121,3	+ 51,3	
M	104,2	+ 1,3	60	0	
A	28,6	- 32	39,7	- 12	
M	8,6	- 34	12,9	- 29	

4020 43422

1984: 4024-47

.../...

P1

BASTIA			AJACCIO		
Mois	Précipitations	Ecart	Précipitations	Ecart	
J	108,7	+ 77	25,1	+ 3	
J	6,2	- 5	27,7	+ 18	
A	56,9	+ 24,3	101,3	+ 84	
S	111	+ 60	42,3	- 5	
O	41	- 59	21	- 67	
N	53	- 41	91	- 2	
D	57,4	- 38	121,1	+ 34	
	614,4	- 163	667,5	+ 4,4	

**Remarque :** les températures "normales" et précipitations "normales" représentent une moyenne calculée sur les 30 dernières années.

Comme l'indiquent les graphiques et relevés ci-joints, l'année 1983 s'est caractérisée par un mois de Juin pluvieux, en particulier sur la Côte Orientale. A succédé un mois de Juillet très chaud. On a enregistré à AJACCIO, le 26 Juillet : 40,3 ° et à BASTIA, le 30 Juillet : 35,1 °. De nombreuses plantes ont ainsi souffert de sécheresse durant ce mois-là. Enfin, de fortes chutes de pluie ont été enregistrées pendant la dernière quinzaine du mois d'Août sur l'ensemble de la CORSE. Elles furent toutefois plus modérées en BALAGNE, mais elles ont favorisé partout l'installation de la Pourriture Grise sur la VIGNE.

L'Oïdium a fait son apparition très tôt et dans les vignes mal protégées, les dégâts ont été visibles sur feuilles et grappes.

Les vols de Tordeuses de la Grappe sont restés faibles en zones traditionnelles. La 1ère génération fut, par contre, importante dans la Plaine Orientale, la seconde moyenne et la troisième faible.

La Flavescence Dorée, quant à elle, continue à s'étendre. Des foyers furent découverts à GHISONACCIA, cette année, ainsi qu'à AJACCIO dans la Plaine de PERI.

Le Mildiou a fait son apparition vers la mi-Mai. Après une évolution parfois rapide en Plaine Orientale, la progression de la maladie fut stoppée par la sécheresse, mais des taches de Mildiou d'automne sont apparues dès le 15 Août.

Sur les arbres fruitiers, des dégâts de Cloque se sont régulièrement manifestés. Des dégâts d'Acariens ainsi que des taches d'Oïdium sont fréquemment observés.

En ce qui concerne les Agrumes, ce sont surtout les Cochenilles, en particulier les Serpettes et les Virgules qui restent les plus préoccupantes.

## ARBRES FRUITIERS

### Soins à prendre au cours des travaux de taille



Moniliose : dégâts sur fruits

On profitera de la taille pour éliminer les pousses présentant des déformations dues à l'Oïdium, les fruits momifiés qui restent fixés à l'arbre, les rameaux morts et les Chancres.

Les grosses plaies de taille et les chancres curetés seront enduits d'un produit désinfectant : (type Kankertox, Quinochancre, Santar...) Il faut ensuite brûler tous les déchets de taille.



Chancres européens sur branche

## Traitement d'hiver des arbres fruitiers

Ils ne se justifient que dans les vergers où furent observés, en cours de végétation, de fortes attaques de ravageurs et maladies. Ces traitements d'hiver permettent de détruire les formes hivernantes de divers parasites (œufs d'acariens, encroutements de cochenilles etc...) ainsi que les mousses et lichens.

Intervenir pendant le repos complet de la végétation, par temps calme, en dehors des périodes de gel et utiliser de préférence la lance pour effectuer un lessivage des arbres.

### PRODUITS UTILISABLES

#### Huiles d'anthracène

Très décapantes, elles détruisent aussi les œufs d'acariens, pucerons, cochenilles et chenilles diverses. On les trouve en mélange avec les colorants nitrés. Ce sont les huiles jaunes. Spécialités commerciales : traitement d'hiver Umupro, Elgetiver activé, Veraline 3.

#### Huiles de pétrole (= huiles blanches)

Propriétés voisines des huiles d'anthracène, mais moins décapantes. Spécialités commerciales : Euphytane, Oliocin, Ovipron et Pest-Oil.

#### Colorants nitrés (D. N. O. C. , Dinosèbe, Dinoterbe)

Sont efficaces contre les œufs d'insectes et diverses maladies. A utiliser avec prudence sur les Nectarines.

D N O C et Dinosèbe	(Nombreuses spécialités)
Dinoterbe	(Nixone ou Herbogil)

#### Colorants nitrés + huiles de pétrole ( Dytrol 50, Dinitrol 3, Seppic Verger)

**ATTENTION** : BIEN RESPECTER LES DOSES ET LES CONDITIONS D'EMPLOI

## A G R U M E S

Suite aux dégâts causés par le vent sur les jeunes pousses, une attaque de bactériose est à craindre.

Intervenir dès la fin de la récolte en effectuant un traitement cuprique à 500 g de cuivre métal/hectolitre. Utiliser 1.000 l. de bouillie par ha.

## V I G N E

### Excoriose

Se reconnaît aux nécroses, à l'écorce fendue en "boutonnière", à l'étranglement à la base des rameaux, ainsi qu'au blanchiment des sarments et apparition de petites taches noires (pycnides). Sur les vignes atteintes, on utilisera un produit à base d'arsénite de soude (625 g de matière active/hl.).

**ATTENTION :** L'arsenite de soude est un produit très toxique pour l'homme et les animaux. Traiter par temps sec, sans vent. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application. Seules sont autorisées les spécialités contenant un produit répulsif pour les animaux (Pyralesca R, Pyralumnol R).

### Esca

Se manifeste pendant la végétation par un rougissement des feuilles entre les nervures et un dépérissement brutal pendant l'été. L'intérieur du bois devient mou. Sur les parcelles touchées en 1983, effectuer un traitement avec de l'arsenite de soude à 1.250 g/hl.

-----

**N'oubliez pas de vous réabonner pour 1984**

Le tarif est de :

- 72 F. pour les abonnements individuels.
- 55 F. pour les abonnements collectifs de plus de 10 abonnements.

Ce rappel ne concerne pas les correspondants chefs de poste ni ceux qui sont abonnés directement par une Coopérative.

-----



